腰腹肉难减 问题可能出在饭菜口味上

明明控糖、减油了，为什么体重还是降不下来？问题可能出在了饭菜的口味上——咸。饮食偏咸，意味着摄入钠过多，这不仅增加了肥胖风险，还会给身体带来一连串的负面影响。记者邀请专家，解读高钠饮食造成体重增加的原因，并教你几个健康减盐法。

吃太咸，腹型肥胖风险增高

2025年，芬兰科学家在欧洲肥胖大会上发表的一项研究表明，高钠饮食会大幅提升全身及腹型肥胖风险。这说明钠摄入量高或尿液钠浓度高的参与者更容易出现全身或腹型肥胖，其中女性高钠摄入组全身肥胖的概率比低钠摄入组高出4.3倍，腹型肥胖概率高出3.4倍；男性尿钠最高组比最低组整体肥胖风险增幅超过330%，全身肥胖风险高出6倍，腹型肥胖风险高出4.7倍。

高钠饮食之所以会增加肥胖几率，可能是因为体内水分大量滞留，并且影响脂肪细胞功能及代谢路径，促进脂肪积累。此外，经常摄入高钠饮食还会刺激食欲，让人在无形中吃得更多。另外，根据一些研究报告，长期摄入高钠饮食会增加皮质醇（压力激素）的水平，而这种激素会直接促进脂肪合成，并倾向于将脂肪导向腹部内脏区域堆积。当吃久了咸口食物，很多人会更想喝甜饮料，最终形成瘦不下来的恶性循环。

为什么要少吃高钠食物

乔治全球健康研究院（中国）副所长、悉尼新南威尔士大学医学院副教授张普洪表示，高钠饮食对健康的危害极大，除了会引起高血压，增加心脑血管疾病风险外，还会造成钙流失，伤及肾脏、胃、呼吸系统等。

■加剧骨质疏松

加拿大阿尔伯塔大学的研究发现，当钠摄入量过高时，身体会通过尿液排出钠，同时带走体内储存的钙。这意味着，我们饮食中摄入的钠盐越多，身体排出的钙越多。这就是高盐摄入可能导致骨质疏松症的重要原因。

■引发肾结石

意大利帕尔马大学针对高盐摄入与肾结石的关系进行研究发现，较高的盐摄入量与高钙尿症和低枸橼酸尿症有关，这是钙质肾结石形成的主要危险因素。

■加重哮喘

美国印第安纳大学布卢明顿分校研究人员在评估食盐摄入对运动诱发哮喘严重程度的研究中发现，低盐饮食的哮喘患者可以比高盐饮食者呼出更多空气，且痰中的炎症标志物少得多，需要支气管扩张药的频率也更低。

■诱发胃癌

高盐摄入会损伤胃壁，使感染幽门螺杆菌的可能性增加，加剧感染，葡萄牙波尔图大学医学院卫生和流行病学系由此确认，盐摄入是胃癌重要的饮食风险因素。《日本癌症研究杂志》研究发现，每日食用味噌汤与幽门螺杆菌的患病率有关，腌制蔬菜消费量的增加也与幽门螺杆菌感染风险的升高有关。

每个人都该学会的“减盐技巧”

中国疾病预防控制中心慢病和老龄健康管理处副研究员张晓畅表示，炒菜时少放5%～10%的盐，不仅不会影响菜肴口味，还能让味蕾和机体对盐味的需求逐渐降低，有助于品尝出食物本身的味道。

1. 可以使用限盐勺、限盐罐，比如一个三口之家，一日三餐平均每顿饭只需两勺半的盐（2克盐勺）。

2. 如果加了酱油或其他调料，适当少放盐，也可以选择低盐酱油；少吃腐乳、咸菜等腌制食品，以及熟食肉类、罐头等加工肉制品。

3. 在外就餐或点外卖时，主动要求少放盐。

4. 学点烹调减盐技巧，出锅前放盐、以天然香料或作料（葱、姜、蒜等）代盐。

5. 有些方便食品和零食，虽然尝起来不太咸，但也是“含盐大户”，如面包、饼干、挂面、话梅、锅巴、咸味瓜子等，要尽量少吃。

6. 购物时多看营养成分表，选择低钠食品。

据生命时报

走得快的人更健康 4个方法帮你提速

有的人说干大事的人走路都很慢、气定神闲。没错走路慢确实很“从容”，但你正常的走路速度，悄悄透露出你的健康密码！最新研究发现，走路快的人不仅看起来更有活力，还可能拥有一种隐藏的“超能力”：大幅降低患癌风险！

走路快患癌风险或降一半

2025年4月，《恶病质、肌少症和肿瘤学杂志》上刊发的一项研究，为走路快的人带来了好消息：走路快的人，患癌风险降低高达53%；在另一组数据中，与走路慢的人（速度＜1.0米/秒）相比，走路快的人（速度≥1米/秒）总体癌症风险降低了45%。不过，研究未发现走路速度与前列腺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌的发病风险存在显著关联。

具体来看：在一组数据中，与走路慢的人相比，走路快的人总体癌症风险降低了13%，肺癌风险降低高达53%；在另一组数据中，与走路慢的人（速度＜1.0米/秒）相比，走路快的人（速度≥1米/秒）总体癌症风险降低了45%。不过，研究未发现走路速度与前列腺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌的发病风险存在显著关联。

走路快的人还有这些优势

1. 更有长寿优势

2019年《梅奥诊所学报》上刊发的一项研究分析47.5万人发现：走路快的人活得比走路慢的人久，能多活15～20年。

2. 更有心肺优势

北京老年医院老年病临床与康复研究所副所长宋岳涛表示，走得快特别能说明心肺功能好。走路的时候，心脏需要强有力的支持，就像汽车跑得快，发动机必须要强劲有力。如果一个人的肺脏功能不好，走几步甚至没走路就喘起来了，那么这样的老年人肯定也走不快。

3. 更有骨骼优势

骨骼健康状况好的老人，骨骼能够支持他们进行更好的运动，自然会走得速度快一点。

4. 更有血压优势

2023年《高血压研究》刊发的一项研究提示，对于中国老年人来说，步行速度较快与高血压风险有关，在这项研究中，与走路慢的人（速度＜1.0米/秒）相比，走路快的人（速度≥1米/秒）总体癌症风险降低了45%。不过，研究未发现走路速度与前列腺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌的发病风险存在显著关联。

提升走路速度做好4件事

1. 每周2～3次抗阻运动

建议每周进行2～3次抗阻运动，每次20～30分钟，如自重训练、使用弹力带等，有助强化肌肉力量，改善整体步态。而且，关节的稳定性依赖于周围的韧带和肌肉，练肌肉也有助于缓解一些关节疼痛问题。

2. 平衡和柔韧性训练

平衡和柔韧性训练也有助于预防摔倒，提高身体的灵活性。比如瑜伽、太极、八段锦、单腿站立等，有助于改善关节灵活性和平衡能力。

3. 中等强度有氧运动

要想走得快，一个好的心肺耐力也非常重要，平时可搭配游泳、骑车、快走等中等强度有氧运动。也可以每天专门拿出15～30分钟练习快步走。行走的速度可根据自身的体质状况选择，循序渐进。健走前建议热身，走路过程中不要含胸驼背，要抬头挺胸，走路的步子不要迈得太大，步子迈太大容易造成肌肉拉伤，冲击力也会增大，膝关节重复做屈曲和伸直动作，造成膝盖损伤。

4. 增加优质蛋白质摄入

四川省人民医院急救中心主任医师江华提醒，蛋白质是肌肉合成最重要的原料之一。吃好三餐，在避免糖、盐、脂过量的前提下，适当增加优质蛋白质类食物的摄入。动物性食物蛋白质的含量和质量都高于植物性食物，老年人可适当增加奶、蛋、瘦肉、禽类、鱼虾和大豆制品摄入，保证足够主食、蔬菜水果，以达到平衡膳食要求。另外，多吃富含维生素C、维生素E、类胡萝卜素、硒、锌、欧米伽-3脂肪酸的食物，如猕猴桃、菠菜、胡萝卜等，也利于预防肌肉衰减，提高免疫功能。

据健康时报

刊登 13018333716 15023163856
热线 023-65909440 微信同号
重庆各地 证件遗失/票据挂失/环评公示/劳动仲裁/法院公告/招标拍卖/注销减资/公告声明/营花广告/出售转让/商业广告…… 各类竖报

◆遗失重庆鹭岛置业有限公司财务专用章5002411063476财务专用章遗失，声明作废
◆遗失重庆市璧山区七塘镇陶峰村用水户饰会农商行璧山支行遗存票处开户许可证核准号J0630111052001声明作废
◆遗失重庆市璧山区七塘镇陶峰村用水户饰会农商行璧山支行基本存款账户账号2001266100052001声明作废
◆遗失重庆市渝北区龙溪街道金凤社区居民委员会印章5001102000001声明作废
◆遗失重庆市渝北区龙溪街道金凤社区居民委员会财务专用章5001102000002声明作废
◆遗失重庆市渝北区龙溪街道金凤社区居民委员会负责人印章5001102000003声明作废
◆遗失重庆市渝北区龙溪街道金凤社区居民委员会统一社会信用代码证92500112MACA7GUD71正副本原件，声明作废
◆遗失重庆市璧山区鑫雅奇园林设计有限公司公章编号5002278033751声明作废
◆遗失重庆市璧山区鑫雅奇园林设计有限公司财务专用章编号5003817046754，发票专用章编号5003817051672，声明作废
◆现有一辆长安欧尚CS55PLUS车辆合格证遗失，车架号：LS5A3DKE5SA200261，颜色：炫彩灰。现声明作废
◆遗失重庆市璧山区七塘镇陶峰村用水户饰会农商行璧山支行基本存款账户账号2001266100052001声明作废
◆遗失重庆市渝北区龙溪街道金凤社区居民委员会印章5001102000001声明作废
◆遗失重庆市渝北区龙溪街道金凤社区居民委员会财务专用章5001102000002声明作废
◆遗失重庆市渝北区龙溪街道金凤社区居民委员会负责人印章5001102000003声明作废
◆遗失重庆市璧山区鑫雅奇园林设计有限公司财务专用章编号5003817046754，发票专用章编号5003817051672，声明作废
◆现有一辆长安欧尚CS55PLUS车辆合格证遗失，车架号：LS5A3DKE5SA200261，颜色：炫彩灰。现声明作废
◆遗失重庆市璧山区七塘镇陶峰村用水户饰会农商行璧山支行基本存款账户账号2001266100052001